

АРТРА® (ARTRA®)

CHONDROITIN SULFATE SODIUM, GLUCOSAMINE

зарегистрировано и произведено
UNIPHARM, Inc. (США)**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

✧ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, с вкраплениями, овальные, двояковыпуклые, с гравировкой "ARTRA" с одной стороны, со специфическим запахом.

1 таб.

хондроитин сульфат натрия 500 мг

глюкозамина гидрохлорид..... 500 мг

Вспомогательные вещества: кальция сульфат двузамещенный – 230 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 185 мг, натрия кроскармеллоза – 80 мг, стеариновая кислота – 70 мг, магния стеарат – 10 мг.

Состав оболочки: гидроксипропилметилцеллюлоза – 35 мг, титана диоксид (Е171) – 8.2 мг, триацетин – 6.8 мг.

30 шт. – флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) – пачки картонные.

60 шт. – флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) – пачки картонные.

100 шт. – флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) – пачки картонные.

120 шт. – флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N014829/01 от 20.12.07**Код АТХ:** M09AX**Клинико-фармакологическая группа:**

Препарат, стимулирующий процесс регенерации хрящевой ткани

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Стимулятор регенерации хрящевой ткани.

Глюкозамин и хондроитин сульфат натрия принимают участие в биосинтезе соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща, стимулируя регенерацию ткани. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса и обеспечивает неспецифическую защиту, в т.ч. от НПВП и ГКС. Препарат обладает умеренным противовоспалительным действием.

Хондроитин сульфат натрия, независимо от того, всасывается ли он в интактной форме или же в виде отдельных компонентов, служит дополнительным субстратом для образования здорового хрящевого матрикса. Стимулирует образование протеогликанов и коллагена типа II, а также защищает хрящевой матрикс от ферментативного расщепления (путем подавления активности гиалуронидазы) и от повреждающего действия свободных радикалов; поддерживает вязкость синовиальной жидкости, стимулирует механизмы репарации хряща и подавляет активность тех ферментов (эластаза, гиалуронидаза), которые расщепляют хрящ. При лечении остеоартрита облегчает симптомы заболевания и уменьшает потребность в НПВП.

ФАРМАКОКИНЕТИКА**Всасывание**

Биодоступность глюкозамина при приеме внутрь – 25% (за счет эффекта "первого прохождения" через печень).

Биодоступность хондроитин сульфата – 13%.

Распределение

Распределяется в тканях: наибольшие концентрации глюкозамина обнаруживаются в печени, почках и суставном хряще. Около 30% принятой дозы длительно персистируют в костной и мышечной ткани.

ВыведениеГлюкозамин выводится преимущественно с мочой в неизменном виде; частично – с калом. $T_{1/2}$ глюкозамина – 68 ч.**ПОКАЗАНИЯ**

– остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Внутрь **взрослым и детям старше 15 лет** назначают по 1 таб. 2 раза/сут в течение трех первых недель; по 1 таб. 1 раз/сут в течение последующих недель и месяцев.

Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата не менее 6 мес.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**Глюкозамин**

Со стороны пищеварительной системы: возможны легкие нарушения функции ЖКТ – боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор.

Со стороны ЦНС: головокружение.

Глюкозамин и хондроитин

Прочие: аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

– выраженное нарушение функции почек;

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: кровотечения или склонность к кровотечениям, бронхиальная астма, сахарный диабет.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Препарат Артра® не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Использование в педиатрии

Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата Артра® у детей в возрасте до 15 лет отсутствуют.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Артра® не сообщалось.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При одновременном применении возможно усиление действия антикоагулянтов и антиагрегантов.

Артра® увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов.

Препарат совместим с ГКС.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°С. Срок годности – 5 лет.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается без рецепта.

ЮНИФАРМ, Инк.

Представительство в России

115162 Москва

Шаболовка ул. 31, стр. Б, под. 5, эт. 3

Тел./факс: (495) 995-77-67