

БЕПАНТЕН® (BERANTHEN)**мазь**

DEXPANTHENOL

*зарегистрировано**БАЙЕР ЗАО (Россия)**произведено**GP GRENZACH PRODUKTIONS GmbH (Германия)***ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

✧ *Мазь для наружного применения 5%* от белого до бледно-желтого цвета, мягкая, эластичная, гомогенная, не-прозрачная, со слабым запахом ланолина.

1 г

декспантенол 50 мг

Вспомогательные вещества: протегин Х – 50 мг, цетиловый спирт – 18 мг, стеариловый спирт – 12 мг, воск пчелиный белый – 40 мг, ланолин – 250 мг, парафин мягкий белый – 130 мг, масло миндальное – 50 мг, парафин жидкий – 150 мг, вода очищенная – до 1000 мг.

3.5 г – тубы алюминиевые лакированные (1) – пачки картонные.

30 г – тубы алюминиевые лакированные (1) – пачки картонные.

100 г – тубы алюминиевые лакированные (1) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N013984/01 от 19.05.08**Код АТХ:** D03AX03**Клинико-фармакологическая группа:**

Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Стимулятор регенерации тканей. Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный обмен.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Декспантенол быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту.

Связывается с белками плазмы крови (главным образом с альбумином и β-глобулином).

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизменном виде.

ПОКАЗАНИЯ

- профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов;
- уход за молочными железами в период кормления (лечение сухости сосков и болезненных трещин);
- лечение и уход за кожей ребенка (опрелость, пеленочный дерматит);
- активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересадке кожи.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Применяют наружно. Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи 1-2 раза/сут и слегка втирают.

Уход за молочными железами у кормящих матерей: мазь наносят на соски после каждого кормления.

Уход за грудным ребенком: мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции: крапивница, зуд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Бепантен® мазь можно применять при беременности и в период грудного вскармливания.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Следует избегать попадания в глаза.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Декспантенол, даже в очень высоких дозах, хорошо переносится и не вызывает каких-либо нежелательных реакций. До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы. Случаи гипервитаминоза неизвестны.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАМОДЕЙСТВИЕ

Случаи взаимодействия с другими лекарственными препаратами неизвестны.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Байер АГ

Представительство в России АО "Байер"
107113 Москва, 3-я Рыбинская ул. 18, стр. 2
Тел.: (495) 231-12-00; Факс: (495) 231-12-02