

**ЭКЗОДЕРИЛ® (EXODERIL®)****раствор**

NAFTIFINE

зарегистрировано  
SANDOZ GmbH (Австрия)  
произведено

GLOBOPHARM Pharmazeutische Productions und Handels GmbH (Австрия)

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

✧ *Раствор для наружного применения* прозрачный, бесцветный или слегка желтого цвета, с запахом этанола.

**1 мл**

нафтифина гидрохлорид..... 10 мг

*Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль – 50 мг, этанол – 400 мг, вода очищенная – 475 мг.

10 мл – флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) – пачки картонные.

20 мл – флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) – пачки картонные.

30 мл – флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) – пачки картонные.

**Номер и дата регистрации:** П N011273/02 от 21.09.11**Код АТХ:** D01AE22**Клинико-фармакологическая группа:**

Противогрибковый препарат для наружного применения

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Противогрибковый препарат для наружного применения из группы аллиламинов. Механизм действия связан с ингибированием синтеза сквален-2,3-эпоксидазы, что приводит к снижению образования эргостерола, входящего в состав клеточной стенки гриба.

Препарат *активен в отношении* дерматофитов *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*, дрожжевых (*Candida* spp., *Pityrosporum*), плесневых грибов (*Aspergillus* spp.) и других грибов (*Sporotrix schenckii*). В отношении дерматофитов и аспергилл нафтифин действует фунгицидно. В отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма. Препарат оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызывать вторичные бактериальные инфекции.

Препарат оказывает противовоспалительное действие, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, особенно зуда.

**ФАРМАКОКИНЕТИКА**

Нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в разных ее слоях, что делает возможным его применение 1 раз/сут.

**ПОКАЗАНИЯ**

- грибковые инфекции кожи и кожных складок (*tinea corporis*, *tinea inguinalis*), в т.ч. межпальцевые микозы (*tinea manuum*, *tinea pedum*);
- грибковые инфекции ногтей (онихомикозы);
- кандидозы кожи;
- отрубевидный лишай;
- дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Экзодерил® эффективен при лечении микозов, поражающих область кожи с гиперкератозом, а также в зоне роста волос.

**РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ**

Экзодерил® следует наносить на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки 1 раз/сут, после тщательной очистки и высушивания, захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения. Длительность лечения при *дерматомикозах* – 2-4 недели (при необходимости – до 8 недель), при *кандидозах* – 4 недели.

При *онихомикозах* перед первым применением раствора необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя ножницами и пилкой для ногтей. Препарат следует применять 2 раза/сут, длительность лечения – до 6 мес. Для *предупреждения рецидивов инфекции* следует проводить терапию в течение не менее 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

*Местные реакции:* в отдельных случаях – сухость кожи, гиперемия, жжение.

Побочные эффекты обратимы и не требуют отмены терапии.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- беременность (безопасность и эффективность не определена);
- период лактации (безопасность и эффективность не определена);

– повышенная чувствительность к нафтифину или пропиленгликолю.  
Противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность.  
С *осторожностью*: детский возраст (опыт клинического применения ограничен).

**БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**

Противопоказано применение препарата Экзодерил® при беременности и в период лактации (безопасность и эффективность не определена).

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза.  
Не требуется специальных мер по уничтожению препарата.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

О случаях передозировки не сообщалось.

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Не отмечено лекарственного взаимодействия препарата Экзодерил® с другими препаратами.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности – 5 лет.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.  
RU1608519479

**САНДОЗ**

Представительство в России ЗАО "Сандоз"  
123315 Москва  
Ленинградский пр-т 72, корп. 3  
Тел.: (495) 660-75-09; Факс: (495) 660-75-10