

ЭНДОФАЛЬК (ENDOFALK)

зарегистрировано
Dr. FALK PHARMA GmbH (Германия)
произведено
LOSAN PHARMA GmbH (Германия)
или S.I.I.T. s.r.l. (Италия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ *Порошок для приготовления раствора для приема внутрь* белого цвета, кристаллический, с ароматно-фруктовым апельсиновым запахом.

1 пак.

макрогол 3350.....	52.5 г
натрия хлорид.....	1.4 г
натрия гидрокарбонат.....	715 мг
калия хлорид.....	185 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный – 0.00046 г, ароматизатор фруктовый – 0.4 г, ароматизатор апельсиновый – 0.1 г, натрия сахаринат – 0.018 г.

55.318 г – пакетики из ламинированного материала (6) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: ЛСР-005714/08 от 21.07.08

Код АТХ: А06АD65

Клинико-фармакологическая группа:

Слабительный препарат с осмотическими свойствами, применяемый для лаважа кишечника

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Слабительный препарат. Эффект обусловлен действием входящих в состав препарата компонентов и заключается в возникновении диареи.

Макрогол 3350 (полиэтиленгликоль) ввиду создания изоосмолярного раствора предотвращает всасывание воды в желудке и кишечнике, способствует ускоренному прохождению и выделению содержимого ЖКТ.

Электролиты солей, входящих в состав препарата, предотвращают нарушение водно-солевого баланса организма.

Полиэтиленгликоль с высокой молекулярной массой из-за отсутствия абсорбции и метаболизма предотвращает нежелательное газообразование, вызываемое метаболизирующим действием бактерий.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Полиэтиленгликоль с высокой молекулярной массой не абсорбируется в ЖКТ и при пассаже не подвергается метаболизму.

ПОКАЗАНИЯ

- подготовка к эндоскопическому или рентгенологическому исследованию нижнего отдела кишечника;
- подготовка к хирургическим манипуляциям, сопровождающимся необходимостью отсутствия содержимого кишечника – химуса.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Взрослым и детям старше 18 лет препарат обычно назначается внутрь в виде раствора. Рекомендованная доза: 3-4 л раствора, принимаемая порциями по 200-300 мл каждые 10 мин.

Для приготовления 1 л раствора, содержимое 2 пакетиков растворяется в 0.5 л охлажденной кипяченой (очищенной) воды и затем объем раствора доводится до 1 литра. Всего для полного очищения кишечника рекомендуется приготовить и принять 3 литра раствора Эндофалька. Время, в течение которого следует принимать раствор, составляет 3-4 ч.

Раствор можно принимать внутрь перорально или его вводят через назогастральный зонд накануне вечером или утром в день, предполагаемого исследования или операции на кишечнике. Также вечером накануне и утром в день исследования необходимо воздерживаться от приема пищи.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Со стороны пищеварительной системы: редко – тошнота, рвота, метеоризм, схваткообразные боли; в начале и некоторое время после приема – ощущение тяжести и дискомфорта в области живота.

Со стороны ЦНС: очень редко – нарушение сна и общее недомогание.

Прочие: очень редко – аллергические реакции.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- выраженные нарушения общего состояния пациента (дегидратация, сердечная и/или почечная недостаточность);
- кишечная непроходимость;
- токсическое расширение толстой кишки;
- стеноз желудка;
- перфорация желудка или кишечника;
- эрозивно-язвенные поражения ЖКТ;

- колит, протекающий с высокой активностью;
- нарушения выделительной функции почек;
- детский возраст до 18 лет.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Пока еще нет опыта клинического применения Эндофалька у беременных. Поэтому Эндофальк следует назначать при беременности и лактации только по строгим показаниям.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Пациентам пожилого возраста с имеющимися сопутствующими заболеваниями, препарат рекомендуется применять под медицинским контролем.

Пациент должен сообщать лечащему врачу обо всех принимаемых им одновременно с Эндофальком лекарственных препаратах, а также о появлении каких-либо побочных эффектов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Влияние на способность управлять транспортными средствами и движущимися механизмами не выявлено.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Данные по передозировке препаратом ввиду отсутствия таковых случаев не предоставлены.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Процесс высвобождения содержимого кишечника, вызванный действием препарата Эндофальк, способен привести к нарушению абсорбции одновременно принятых других лекарственных препаратов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 5 лет.

Приготовленный раствор должен храниться не более 3 ч при температуре 25°C или 48 ч при температуре 5°C (в холодильнике).

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Доктор Фальк Фарма ООО
127055 Москва
Бутырский Вал ул. 68/70, стр. 4,5
Тел./факс: (495) 933-99-04