



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ENTEROSGEL®

Пероральная суспензия

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ АДСОРБЕНТ ENTEROSGEL® ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕЕ ПРИ СРК

ЭНТЕРОСГЕЛЬ®

- Туба 225 г
- Туба 90 г
- Саше 15 г (10 саше в упаковке)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® — это суспензия для перорального применения, предназначенная для лечения симптомов острой диареи и хронической диареи, связанной с синдромом раздраженного кишечника (СРК).

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭНТЕРОСГЕЛЬ® И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® — это кишечный адсорбент (энтеросорбент) для перорального применения. Основное действующее вещество препарата — органический минерал, способный адсорбировать некоторые токсичные и вредные вещества в кишечнике (такие как эндотоксины, энтеротоксины), физически увязывая их на своей поверхности, сокращая частоту стула и длительность диареи. ЭНТЕРОСГЕЛЬ® выводится из организма со стулом вместе с адсорбированными токсинами и вредными веществами, что может оказывать благоприятное воздействие при лечении острой и хронической диареи при СРК.

Состав: полиметилсилоксана полигидрат (гидрогель метилкремниевой кислоты) — 70%, вода очищенная — 30%. ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не содержит консервантов, красителей, глутена, жиров, сахара, лактозы, вкусовых добавок, веществ растительного или животного происхождения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ЭНТЕРОСГЕЛЬ® следует принимать за 2 часа до или через 2

часа после еды или перорального приема лекарств.

- Принимайте ЭНТЕРОСГЕЛЬ® в течение 3–5 дней при острой диарее и до 21 дня при хронической диарее.
- Перед приемом разведите положенную дозу в воде комнатной температуры.
- Содержимое саше принимайте сразу же после вскрытия. Разведите препарат в воде
- Содержимое тубы следует использовать в течение 30 дней после открытия.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Дети:

- **1–3 года:** дозировка и длительность применения препарата определяется после консультации с врачом.
- **1–6 лет:** 5 г (приблизительно 1 чайная ложка или 1/3 саше) развести в 50–100 мл воды, принимать 3 раза в день.
- **7–14 лет:** 10 г (приблизительно 2 чайные ложки или 2/3 саше) развести в 50–100 мл воды, принимать 3 раза в день.

Дети старше 15 лет и взрослые:

- 15 г — 22,5 г (приблизительно 1 столовая ложка или 1–1,5 саше) развести в 200 мл воды, принимать 3 раза в день.

В начале лечения (в первый день) можно удвоить первую дозу, а затем применять обычную дозу после каждого акта дефекации, т.е. от 3 до 6 раз в день. В первый день разрешается принять не более 8 доз.

- Приостановите лечение препаратом ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, если стул отсутствует в течение 1–2 дней, увеличьте потребление воды и продолжите лечение после следующего стула.
- При лечении хронической диареи дозировку можно менять в зависимости от консистенции и частоты стула. Можно принимать двойную дозу 3 раза в день, если стул жидкий, или сократить прием до 1 дозы в день, если стул нормализуется. Разрешается принимать не более 6 доз в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не принимайте ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, если вы принимаете перо-

ральные лекарства с модифицированным (регулируемым) высвобождением, при атонии кишечника (сильном запоре по причине непроходимости кишечника) или кишечной непроходимости,

- в случае непереносимости препарата на основании его предшествующего применения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Запор, тошнота.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® разрешается применять беременным и кормящим женщинам. В случае ухудшения самочувствия им рекомендуется обратиться к врачу.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

- ЭНТЕРОСГЕЛЬ® может повлиять на всасывание некоторых лекарственных препаратов, принимаемых перорально, поэтому принимайте препарат за 2 часа до или через 2 часа после перорального приема лекарств. Если вы принимаете какие-то лекарства, перед употреблением препарата ЭНТЕРОСГЕЛЬ® проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- ЭНТЕРОСГЕЛЬ® следует принимать перорально между приемами пищи.
- При продолжительной диарее перед приемом препарата рекомендуется проконсультроваться с врачом, чтобы установить диагноз основного заболевания.
- У детей лечение диарее следует дополнить своевременным употреблением достаточного количества жидкости для предотвращения обезвоживания.
- Взрослым при лечении препаратом ЭНТЕРОСГЕЛЬ® рекомендуется принимать достаточное количество жидкости, чтобы обеспечить правильную регидратацию.
- Если симптомы диареи не исчезают более 2-х дней, следует проконсультроваться с врачом.
- При высокой температуре, крови в стуле, признаках обезвоживания, учащенном

стуле (6 раз или более раз за последние 24 часа), если диарея сопровождается рвотой, сильной или непрекращающейся болью в животе, следует немедленно обратиться к врачу, особенно, если речь идет о ребенке.

- О применении препарата ЭНТЕРОСГЕЛЬ® в течение первого триместра беременности не существует клинических данных. Прежде чем применять препарат, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте, если упаковка изделия повреждена.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не превышайте рекомендованную дозу.
- Не превышайте рекомендованную длительность лечения и не принимайте вместе с едой, чтобы не допустить дефицита витаминов или питательных веществ.
- Проконсультируйтесь с врачом, если в настоящее время вы принимаете другие кишечные адсорбенты, например, препараты с содержанием активированного угля, глины или каолина. Возможно, врач посоветует вам не принимать их вместе с препаратом ЭНТЕРОСГЕЛЬ®.
- ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не предназначен для применения в случае острых химических отравлений, отравлений лекарственными препаратами или передозировки лекарствами.

Саше

- После вскрытия саше следует сразу же использовать его содержимое.
- Каждое саше предназначено для однократного применения и должно вскрываться непосредственно перед применением.
- Не используйте частично поврежденные или вскрытые ранее саше, чтобы предотвратить бактериальное загрязнение.

Тубы

Тщательно встряхните тубу перед открытием и каждым приемом препарата. При выдавливании пасты ЭНТЕРОСГЕЛЬ® из тубы или саше возможно выделение некото-

рого количества жидкости. После открытия и каждого применения плотно закрутите крышку тубы, чтобы предотвратить высыхание и бактериальное загрязнение. Содержимое тубы используйте в течение 30 дней после открытия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не разрешается использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Храните в недоступном для детей месте.

Храните ЭНТЕРОСГЕЛЬ® при температуре от 4 °С до 30 °С.

Не замораживайте.

Берегите от воздействия сильного тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности на упаковке указан для запечатанного продукта при условии правильного хранения.

ЛИКВИДАЦИЯ

Для ликвидации непригодного препарата ЭНТЕРОСГЕЛЬ® нет специальных требований. Утилизация разрешается вместе с бытовыми отходами. Упаковка предусмотрена для переработки.

Упаковка: пероральная суспензия — туба 225 г, туба 90 г, саше 15 г (10 саше в упаковке).

Срок годности: 3 года. Не разрешается использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Если у вас возникнут другие вопросы об изделии ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, отправьте их по электронной почте: info@enterosgel.eu.

Настоящая Инструкция по применению доступна на других языках на www.enterosgel.eu.




Дата обновленной версии инструкции по применению: 25 июля 2019 г.

LRQA/ZP/RU/2

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® ТУБА:



ЭНТЕРОСГЕЛЬ® САШЕ:



ДОЗИРОВКА:

Возраст	Доза	Частота применения
Дети 3–6 лет	5 г (≈ 1 чайная ложка)	3 раза в день
	или 1/3 саше	
Дети 7–14 лет	10 г (≈ 2 чайные ложки)	3 раза в день
	или 2/3 саше	
15+ и взрослые	15–22,5 г (≈ 1 столовая ложка)	3 раза в день
	1–1,5 саше	

Графические обозначения на упаковке:



Не предназначено для многоразового применения



Минимальный срок годности



Партия



Производитель



Пожалуйста, прочтите инструкцию



Диапазон температур



Сертифицированное медицинское изделие



Одноразовая упаковка



Использованную упаковку поместите в соответствующий мусорный контейнер. Упаковка предназначена для переработки.



За упаковку выплачен сбор авторизованной компании по обращению с упаковкой.



Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Bioline Products

Bioline Products s.r.o.
Krašovská 1338/10
110 00 Praha 1, Česká republika
e-mail: info@enterosgel.eu
www.enterosgel.eu
+420 800 414 005

Медицинское изделие

CE
0088

Относится к продукции, изготовленной до 26. 05. 2020

ENTEROSGEL®