

ФЕНИСТИЛ® ПЕНЦИВИР (FENISTIL PENCIVIR)

PENCICLOVIR

зарегистрировано
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. (Швейцария)
произведено
NOVARTIS PHARMA PRODUCTIONS GmbH (Германия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ **Крем для наружного применения 1%** однородный, белого цвета.

1 г

пенцикловир 10 мг

Вспомогательные вещества: цетомакрогол 1000 – 9.4 мг, цетостеариловый спирт – 77.2 мг, парафин белый мягкий – 148.5 мг, масло вазелиновое (парафин жидкий) – 59.4 мг, пропиленгликоль – 416.8 мг, вода очищенная – 278.7 мг.

2 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.

2 г – тубы алюминиевые (1) – пеналы пластиковые в комплекте с зеркалом и аппликаторами (20 шт.).

5 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.

5 г – тубы алюминиевые (1) – пеналы пластиковые в комплекте с зеркалом и аппликаторами (20 шт.).

✧ **Крем для наружного применения (с тонирующим эффектом) 1%** однородный, от бежевого до коричневого цвета.

1 г

пенцикловир 10 мг

Вспомогательные вещества: цетомакрогол 1000 – 9.4 мг, цетостеариловый спирт – 77.2 мг, парафин белый мягкий – 148.5 мг, масло вазелиновое (парафин жидкий) – 59.4 мг, пропиленгликоль – 415.55 мг, вода очищенная – 277.45 мг, краситель железа оксид красный – 1.7 мг, краситель железа оксид желтый – 0.8 мг.

2 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.

5 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: ЛС-001926 от 19.08.11

Код АТХ: D06BB06

Клинико-фармакологическая группа:

Противовирусный препарат для наружного применения

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Противовирусный препарат для наружного применения. Пенцикловир – противовирусный препарат, активен в отношении вирусов Herpes simplex 1 и 2 типа, вируса Varicella zoster. Вирус может находиться в неактивной форме в организме в течение продолжительного периода времени. В момент активации (например, вследствие усталости, простуды, гриппа) вирус начинает размножаться, что приводит к развитию лихорадки в виде пузырьковых высыпаний, особенно часто это наблюдается на губах или на участках вокруг них. Пенцикловир блокирует вирус и останавливает его размножение. Применение препарата приводит к более быстрому выздоровлению, уменьшению интенсивности болевых ощущений, сокращается период риска передачи вирусной инфекции.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При наружном применении препарат практически не подвергается системной абсорбции. Современными аналитическими методами не удается выявить пенцикловир в крови или моче здоровых добровольцев после применения крема Фенистил® Пенцивир в дозах, во много раз превышающих терапевтические.

Проникая в пораженные вирусом клетки, пенцикловир быстро переходит в пенцикловира трифосфат, обладающий фармакологической активностью и сохраняющийся в пораженных клетках в течение 12 ч.

ПОКАЗАНИЯ

– рецидивирующий простой герпес с локализацией на губах (herpes labialis).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат применяют наружно.

Взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше: небольшой объем крема выдавливают на кончик пальца и наносят на пораженный участок каждые 2 ч (примерно 8 раз/сут). Курс терапии проводится в течение 4 дней.

Крем также можно наносить при помощи ватного тампона или одноразового аппликатора (для упаковок, содержащих аппликаторы).

Крем для наружного применения с тонирующим эффектом обладает маскирующими свойствами, маскирует пораженные герпесом участки на губах и на коже вокруг рта.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Местные реакции: возможны жжение, пощипывание или онемение сразу же после нанесения препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

– детский возраст до 12 лет;

– повышенная чувствительность к пенцикловиру, фамцикловиру или к другим компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по строгим показаниям в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или грудного ребенка.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Необходимо тщательно вымыть руки до и после нанесения крема.

Лечение следует начинать как можно раньше, при появлении первых признаков развития инфекции. Тем не менее, даже при развитии герпеса в стадии пузырьков применение крема Фенистил® Пенцивир сокращает время выздоровления (залечивает пораженные участки, уменьшает болевые ощущения и укорачивает продолжительность периода шелушения корки, образовавшейся от вирусного воздействия).

У пациентов с ослабленным иммунитетом или если проявления заболевания носят неопределенный характер, необходимость применения препарата врач решает индивидуально.

Препарат следует использовать только на пораженных герпесом участках на губах и на коже вокруг рта. Не рекомендуется наносить крем на слизистую оболочку полости рта, носа или в области глаз и половых органов.

Необходимо проводить полный курс терапии с применением крема Фенистил® Пенцивир в течение 4 дней, для того чтобы добиться наибольшего эффекта от проводимой терапии, даже если признаки инфекции исчезают после одного-двух дней лечения.

При ухудшении состояния или при отсутствии улучшения после 4 дней проведения терапии пациент должен обратиться к лечащему врачу

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Какие-либо лекарственные взаимодействия для крема Фенистил® Пенцивир не известны.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C; не замораживать. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.