ФЛЕБОДИА 600 (PHLEBODIA 600)

DIOSMIN

зарегистрировано
Laboratoires INNOTHERA (Франция)
произведено
INNOTHERA CHOUZY (Франция)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** розового цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
диосмин в пересчете на сухое вещество	600 мг

Вспомогательные вещества: тальк – 10.24 мг, кремния диоксид коллоидный – 3.5 мг, стеариновая кислота – 50.05 мг, целлюлоза микрокристаллическая – до 910 мг.

Состав пленочной оболочки: Сепифилм® 002 (гипромеллоза (Е 464) – 9.832 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 7.866 мг, макрогола 8 стеарат тип 1 – 1.967 мг); Сеписперс® АР 5523 розовый (пропиленгликоль – следы, гипромеллоза (Е 464) – 0.458 мг, титана диоксид (Е 171) – 4.026 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] (Е 124) – 0.401 мг, железа оксид черный (Е 172) – 0.13 мг, железа оксид красный (Е 172) – 0.02 мг); Опаглос® 6000 (воск карнаубский (Е 903) – 0.075 мг, воск пчелиный (Е 901) – 0.075 мг, шеллак (Е 904) – 0.15 мг, этанол 95° – следы).

15 шт. – блистеры Ал/ПВХ (1) – пачки картонные.

15 шт. – блистеры Ал/ПВХ (2) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N016081/01 от 18.11.09

Код АТХ: C05CA03

Клинико-фармакологическая группа:
Венотонизирующий препарат

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат обладает флеботонизирующим действием (уменьшает растяжимость вен, повышает тонус вен (дозозависимый эффект), уменьшает венозный застой), улучшает лимфатический дренаж (повышает тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивает их функциональную плотность, снижает лимфатическое давление), улучшает микроциркуляцию (повышает резистентность капилляров (дозозависимый эффект), уменьшает их проницаемость), уменьшает адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в паравенозные ткани, улучшает диффузию кислорода и перфузию в кожной ткани, обладает противовоспалительным действием. Усиливает сосудосуживающее действие адреналина, норадреналиия, блокирует выработку свободных радикалов, синтез простагландинов и тромбоксана.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Быстро всасывается из ЖКТ, обнаруживается в плазме через 2 ч после приема. C_{max} в плазме крови достигается через 5 ч после приема. Равномерно распределяется и накапливается во всех слоях стенки полых вен и подкожных вен нижних конечностей, в меньшей степени – в почках, печени и легких и других тканях.

Избирательное накопление диосмина и/или его метаболитов в венозных сосудах достигает максимума к 9 часу после приема и сохраняется в течение 96 ч. Выводится почками – 79%, кишечником – 11%, с желчью – 2.4%.

ПОКАЗАНИЯ

В составе комплексной терапии:

- для устранения симптомов лимфовенозной недостаточности нижних конечностей: ощущение тяжести или усталости в ногах, боль;
- дополнительное лечение при нарушении микроциркуляции;
- симптоматическая терапия острого геморроя.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Препарат предназначен для приема внутрь.

При *варикозном расширении вен нижних конечностей и хронической лимфовенозной недостаточности* (отеки, боли, судороги) назначают по 1 таб./сут. утром натощак. Продолжительность терапии обычно составляет 2 месяца.

При *обострении геморроя* препарат назначают по 2-3 таб./сут. во время еды в течение 7 дней.

Если пропущен один или несколько приемов препарата, необходимо продолжать применение препарата в обычном режиме и в обычной дозе.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях повышенная чувствительность к компонентам препарата, требующая перерыва в лечении: *со стороны ЖКТ* – диспептические расстройства (изжога, тошнота, боли в животе), *со стороны ЦНС* – головная боль.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

− повышенная чувствительность к компонентам препарата;
− период грудного вскармливания;
− детский возраст до 18 лет;
− беременность (I триместр) (опыт применения ограничен).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

До сих пор в клинической практике не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата у беременных. Применение в период беременности во II и III триместрах возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
В экспериментальных исследованиях не было выявлено тератогенного воздействия на плод. Во время грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата, т.к. отсутствуют данные о проникновении препарата в грудное молоко.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Лечение острого приступа геморроя проводят в комплексе с другими препаратами, при отсутствии быстрого клинического эффекта необходимо провести дополнительное обследование и скорректировать проводимую терапию.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы передозировки не описаны.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Клинически значимых эффектов взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Хранить при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Laboratoire Innotech International
Представительство в России
127051 Москва, Петровка ул. 20/1, оф. 15
Тел./факс: (495) 775-41-12