

**ФОСФОГЛИВ® ФОРТЕ
(PHOSPHOGLIV FORTE)**

зарегистрировано и произведено
ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Капсулы твердые желатиновые, №0, с корпусом и крышечкой коричневого цвета; содержимое капсул – масляная пастообразная масса от светло-желтого до оранжево-коричневого цвета, со слабым специфическим запахом.

1 капс.

фосфолипиды (липоид ППЛ-400) 400 мг,

в пересчете на основной компонент – фосфатидилхолин 73-79%.....300 мг

натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты)65 мг

10 шт. – упаковки контурные ячейковые (5) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: ЛСР-008120/08 от 14.10.08

Код АТХ: А05АХ

Клинико-фармакологическая группа:

Гепатопротектор с иммуномодулирующим и противовирусным действием

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Комбинированный препарат.

Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.

Фосфатидилхолин (основной компонент фосфолипидов) является основным структурным элементом клеточных и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая цитопротекторное действие.

Нормализует белковый и липидный обмены, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных веществ, восстанавливает дезинтоксикационную функцию печени, ингибирует формирование соединительной ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.

Глицират (глицирризиновая кислота и соли) обладает противовоспалительным действием, подавляет репродукцию вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, усиления фагоцитоза, увеличения активности естественных клеток-киллеров. Оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Потенцирует действие эндогенных глюкокортикостероидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.

При поражениях кожи за счет мембраностабилизирующего и противовоспалительного действия компонентов ограничивает распространение процесса и способствует регрессу заболевания.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Компоненты препарата хорошо всасываются в кишечнике, как в виде целой молекулы, так и биоактивных продуктов их гидролиза (ненасыщенные жирные кислоты, холин, глицирретовая кислота), которые после всасывания через стенки кишечника легко проникают в печень, легкие, кожу и другие органы.

ПОКАЗАНИЯ

- вирусный гепатит (острый и хронический);
- жировая дегенерация печени (гепатоз);
- лекарственные, алкогольные, токсические поражения печени;
- цирроз печени;
- интоксикации;
- псориаз;
- нейродермит;
- экзема.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат принимают внутрь, во время еды. Капсулы следует запивать небольшим количеством жидкости.

Взрослым назначают по 1-2 капс. 3 раза/сут, **детям старше 12 лет** – по 1 капс. 3 раза/сут.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Дерматологические реакции: кожная сыпь, которая исчезает после отмены препарата (при повышенной индивидуальной чувствительности).

Редко, при превышении суточных доз, могут отмечаться задержка натрия и жидкости, что проявляется периферическими отеками и повышением АД, гипокалиемия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При появлении задержки натрия и жидкости и гипокалиемии, в зависимости от их выраженности, необходимо уменьшить дозу препарата и/или назначить спиронолактон по 50-100 мг/сут.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаев передозировки препарата Фосфоглив® форте не отмечено.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Лекарственное взаимодействие препарата Фосфоглив® форте не описано.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.

ФАРМСТАНДАРТ АО

141700 Московская обл.

г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д 5Б

Тел./факс: (495) 970-00-30