

ГЕКСИКОН® (HEXICON)

CHLORHEXIDINE

зарегистрировано и произведено
НИЖФАРМ ОАО (Россия)**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

✧ *Суппозитории вагинальные* белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы, допускается мраморность поверхности.

1 супп.

хлоргексидина биглюконат 16 мг

Вспомогательные вещества: макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500), макрогол 400 (полиэтиленоксид 400).

1 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.

5 шт. – упаковки ячейковые контурные (2) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: P N001901/01 от 26.09.08**Код АТХ:** G01AX**Клинико-фармакологическая группа:**

Антисептик для местного применения в гинекологии

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Антисептический препарат для местного применения.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Treponema pallidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis; *простейших:* Trichomonas vaginalis; *вирусов:* Herpes simplex типов 1 и 2.

Гексикон® не нарушает функциональную активность лактобацилл.

Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При интравагинальном практически не всасывается, системного действия не оказывает.

ПОКАЗАНИЯ

- профилактика инфекций, передаваемых половым путем (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, генитального герпеса);
- профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортom, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);
- лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем, назначают однократно 1 суппозиторий. Препарат следует применять не позже 2 ч после полового акта.

Для лечения назначают по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7-10 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ*Возможны:* аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

– гиперчувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Препарат не противопоказан для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон® Д.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексикон® не сообщалось.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Гексикон® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость вагинальных суппозитория Гексикон®, т.к. препарат применяется интравагинально.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

ШТАДА

603950 Нижний Новгород, Салганская ул. 7

Тел.: (831) 278-80-88; Факс: (831) 430-72-28