

Перед применением лекарственного средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ИНГАЛИПТ

Inhalyptum

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалипт

Группировочное наименование: Мяты перечной листьев масло + Сульфаниламид + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта шарикового листьев масло.

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав (на один баллон): (15 мл) или (30 мл)

Действующие вещества:

Сульфаниламид натрия (стрептоцид растворимый)	– 0,375 г или 0,750 г;
Сульфатиазола натрия пентагидрат	– 0,375 г или 0,750 г;
Эвкалиптовое масло	– 0,0075 г или 0,015 г;
Мяты перечной масло	– 0,0075 г или 0,015 г;
Тимол	– 0,0075 г или 0,015 г.

Вспомогательные вещества:

Этанол (спирт этиловый 95 %)	– 0,900 г или 1,800 г;
Сахароза (сахар белый)	– 0,750 г или 1,500 г;
Глицерол (глицерин)	– 1,050 г или 2,100 г;
Полисорбат-80	– 0,450 г или 0,900 г;
Вода очищенная	– до 15 мл или до 30 мл;
Азот	– от 0,150 до 0,200 г или от 0,300 до 0,400 г

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, при выходе из баллона образует струю с характерным запахом тимола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство комбинированное.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местного применения. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки). Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение возможно по рекомендации врача, когда польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно. Сняв предохранительный колпачок с флакона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта 1-2 секунды. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

При использовании баллон следует держать строго вертикально.

Побочное действие

Аллергические реакции (высыпания на коже, зуд), кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

При проявлении побочных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение: специфический антидот отсутствует, симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Совместим с другими лекарственными средствами, данные о клинически значимых взаимодействиях отсутствуют.

Возможно одновременное применение с другими местными противомикробными средствами с целью расширения спектра действия и повышения эффективности.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача.

Информация о неблагоприятном влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами - не зарегистрирована.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения по 15 или 30 мл в баллонах аэрозольных алюминиевых. Каждый баллон вместе с предохранительным колпачком, распылителем и инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Владелец РУ/предприятие-производитель/организация, принимающая претензии по качеству:

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 338-719, 326-948

Факс: (3854) 326-943

Генеральный директор

ЗАО «Алтайвитамины»

Ю.А.Кошелев