

ИЗОФРА (ISOFRA)

FRAMYCETIN

*Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI***ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА****Спрей назальный 1.25%****1 мл**

фрамицетина сульфат 12.5 мг (8 тыс. МЕ)

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, натрия хлорид, лимонная кислота, вода дистиллированная. 15 мл – флаконы полиэтиленовые (1) в комплекте с распылителем – пачки картонные.**Номер и дата регистрации:** П N015454/01 от 15.12.08**Код АТХ:** R01AX08**Клинико-фармакологическая группа:**

Антибактериальный препарат для местного применения в ЛОР-практике

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕАнтибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии. Действует бактерицидно. *Активен в отношении* грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих развитие инфекционных процессов в верхних отделах дыхательных путей.**ФАРМАКОКИНЕТИКА**

Исследования фармакокинетики препарата Изофра не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

ПОКАЗАНИЯ

В составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, в т.ч.:

- риниты;
- ринофарингиты;
- синуситы (при отсутствии повреждений перегородки).

Профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ**Взрослым** назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 4-6 раз/сут.**Детям** назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза/сут.

Средняя продолжительность курса терапии – 7 дней.

При употреблении флакон следует держать в вертикальном положении.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ*Аллергические реакции:* в единичных случаях – кожные проявления.**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

– повышенная чувствительность к фрамицетину и другим антибиотикам из группы аминогликозидов.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Изофра при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Если в течение 7 дней лечения терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо, препарат необходимо отменить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Клинически значимых взаимодействий препарата Изофра с другими лекарственными средствами не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.

Laboratoires BOUCHARA

РУСФИК ООО

123610 Москва, Краснопресненская наб. 12

г-ца "Международная-2", оф. 747

Тел.: (495) 258-20-06; Факс: (495) 258-20-07