

КЛИМАДИНОН® (KLIMADYNON®)
таблетки

CIMICIFUGA RHIZOMA

зарегистрировано
BIONORICA SE (Германия)
произведено
ROTTENDORF PHARMA GmbH (Германия)
фасовка, упаковка и выпускающий контроль качества
BIONORICA SE (Германия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

❖ **Таблетки, покрытые оболочкой** розового цвета с коричневым оттенком, круглые, двояковыпуклые.

1 таб.сухой экстракт корневищ цимицифуги (*Cimicifuga racemosa* L.)* 20 мг

* содержит 2.8 мг нативного экстракта корневищ цимицифуги (5-10:1, экстрагент этанол 58% о/о) и лактозы моногидрата 17.2 мг.

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, тальк, титана диоксид (E171), железа окись желтая (E172), железа окись красная (E172), макрогол 6000, зудрагит RL 30D (аммония метакрилат сополимер (1:2:0.2) 1.35 мг и сорбиновая кислота 0.01 мг).

15 шт. – блистеры (4) – коробки картонные.

15 шт. – блистеры (6) – коробки картонные.

Номер и дата регистрации: П N014246/01 от 30.07.07**Код АТХ:** G02CX**Клинико-фармакологическая группа:**

Фитопрепарат, применяемый при климактерическом синдроме

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Противоклимактерическое средство растительного происхождения. Климадинон® обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему. Применение препарата способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов недомогания в климактерический период.

Терапевтический эффект препарата Климадинон® наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели лечения.

ПОКАЗАНИЯ

– вегето-сосудистые расстройства в менопаузе, пре- и постменопаузе ("приливы", усиление потоотделения, повышенная возбудимость, лабильность настроения, нарушение сна, апатия и другие).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат принимают внутрь, по 1 таблетке 2 раза/день в одно и то же время суток (утром и вечером).

Таблетки следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Длительность лечения определяется врачом. Препарат не следует применять более 3 месяцев без консультации врача.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно: аллергические реакции, увеличение массы тела; в *редких случаях* – боли в эпигастральной области, чувство напряжения в молочных железах и менструальноподобные кровотечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- эстрогензависимые опухоли;
- непереносимость лактозы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания.

При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Больные сахарным диабетом могут принимать таблетки Климадинон®, т.к. разовая доза данного препарата содержит менее 0.04 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортом и работать с механизмами, требующими повышенного внимания.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки и интоксикации на настоящее время неизвестны.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

БИОНОРИКА ООО

119619 г. Москва,

6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1

Тел./факс (495) 502-90-19