

ЛЕГАЛОН 140 (LEGALON 140)

CARDUI MARIAE FRUCTUS

*зарегистрировано MEDA PHARMA GmbH & Co.KG (Германия)
произведено MADAUS GmbH (Германия)***ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

Капсулы твердые желатиновые, размер №1, с корпусом и крышечкой коричневого цвета; содержимое капсул – порошок желтого цвета.

1 капс.

сухой экстракт плодов расторопши пятнистой (36-44:1) 173-186.7 мг,
что соответствует содержанию [ДНФГ] 140 мг
[ВЭЖХ] силимарина в пересчете на силибинин 108.2 мг

Вспомогательные вещества: полисорбат 80, повидон, маннитол, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат.

Состав оболочки капсулы: желатин, краситель железа оксид красный (E172), титана диоксид (E171), натрия лаурилсульфат, краситель железа оксид черный (E172).

10 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.

10 шт. – блистеры (3) – пачки картонные.

10 шт. – блистеры (6) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N011358/01 от 26.06.09

Код АТХ: A05BA03

Клинико-фармакологическая группа:

Гепатопротектор

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Взаимодействует со свободными радикалами в печени и переводит их в менее токсичные соединения, прерывая процесс перекисного окисления липидов, препятствует разрушению клеточных структур. В поврежденных гепатоцитах стимулирует синтез структурных и функциональных белков и фосфолипидов (за счет специфической стимуляции РНК-полимеразы А), стабилизирует клеточные мембраны, предотвращает потерю компонентов клетки (трансаминаз), ускоряет регенерацию клеток печени. Тормозит проникновение в клетку некоторых гепатотоксичных веществ.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Абсорбция – низкая и медленная (период полуабсорбции – 2.2 ч), метаболизируется в печени путем конъюгации, $T_{1/2}$ – 6 ч. Выводится преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов. Не кумулирует в организме. Отмечается кишечно-печеночная циркуляция.

ПОКАЗАНИЯ

– токсические поражения печени (алкоголизм; интоксикация галогенсодержащими углеводородами, соединениями тяжелых металлов; лекарственные поражения печени) и их профилактика.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Внутрь, после еды, запивая небольшим количеством воды. По 1 капсуле 3 раза/сут. Поддерживающая доза – по 1 капсуле 2 раза/сут.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции, редко – послабляющее действие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не описано.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Хранить препарат в защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.