

ЛИЗОБАКТ® (LYSOBACT)

LYSOZYME, PYRIDOXINE

*зарегистрировано и произведено
БОСНАЛЕК АО (Босния и Герцеговина)***ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

❖ **Таблетки для рассасывания** белого или желтовато-белого цвета, круглые, с разделительной риской на одной стороне и фаской на обеих сторонах, возможны включения в виде темных точек.

1 таб.

лизоцима гидрохлорид 20 мг

пиридоксина гидрохлорид..... 10 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 155.4 мг, камедь трагакантовая – 10 мг, магния стеарат – 4 мг, натрия сахаринат – 0.5 мг, ванилин – 0.1 мг.

10 шт. – блистеры (1) – пачки картонные.

10 шт. – блистеры (3) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N014179/01-2002 от 06.05.08**Код АТХ:** R02AA20**Клинико-фармакологическая группа:**

Антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Антисептик комбинированного состава для местного применения. Действие препарата обусловлено входящими в его состав компонентами.

Лизоцим является ферментом белковой природы, применяется как антисептик вследствие его прямого воздействия на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также грибы и вирусы. Принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета.

Пиридоксин оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта (оказывает антиафтозный эффект).

Не влияет на фармакодинамические свойства лизоцима.

ПОКАЗАНИЯ

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани:

- гингивит;
- стоматит;
- катаральные явления верхних отделов дыхательных путей;
- афтозные изъязвления;
- герпетические поражения слизистой оболочки полости рта (в составе комплексной терапии);
- эрозии слизистой оболочки полости рта различной этиологии.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат применяют местно в полости рта.

Детям в возрасте 3-7 лет – по 1 таб. 3 раза в сутки, **детям в возрасте 7-12 лет** – по 1 таб. 4 раза в сутки; **взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 2 таб. 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 8 дней.

Таблетки препарата Лизобакт® следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблеток в полости рта как можно дольше, до полного растворения.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно: аллергические реакции.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Возможно применение препарата Лизобакт® при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В случае появления аллергической реакции применение препарата необходимо прекратить. В таких случаях пациент должен обратиться к врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах значительно превышающих терапевтические и проявляются чувством онемения, ощущением покалывания, а также потерей чувствительности в области верхних и нижних конечностей.

Лечение: обильное питье (форсированный диурез).

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При совместном применении Лизобакт® усиливает действие антибиотиков, в т.ч. пенициллина, хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы.

Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать потребность в пиридоксине (антагонистическое действие по отношению к пиридоксину или увеличение ренальной экскреции).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 10° до 30°С. Срок годности – 5 лет.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

БОСНАЛЕК АО

119435 Москва

Саввинская набережная, 11

Тел./факс: (495) 771-76-32