

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ОКСОЛИН

Регистрационный номер: P N003085/01

Торговое наименование препарата
Оксолин

Международное непатентованное или группировочное наименование
Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Лекарственная форма
Мазь назальная

Состав на 1 г
Действующее вещество: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксонафтилин, оксолин) – 2,5 мг; *вспомогательные вещества:* лимонной кислоты моногидрат, вазелин

Описание
Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа
Противовирусное средство для местного применения

Код АТХ: J05AX.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Противовирусное средство для назального применения. Обладает противовирусной активностью в отношении вируса гриппа, блокируя места связывания вируса с поверхностью клеточной мембраны, препятствует репродукции вируса в клетках. К действию диоксотетрагидрокситетрагидронафталина чувствительны также вирусы Herpes simplex, опоясывающего герпеса, аденовирусы, вирусы инфекционных бородавок и контагиозного моллюска.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20% препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, период лактации, возраст до 2-х лет.

Способ применения и дозы

Для профилактики гриппа - ежедневно 2-3 раза в день смазывают слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: слизистую оболочку носа смазывают 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Побочное действие

Жжение слизистой оболочки полости носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки.

Передозировка

Случаи передозировки препарата Оксолин мазь назальная неизвестны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания***Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами***

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами, работу с механизмами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь назальная 0,25 %.

По 10 или 30 г в тубы алюминиевые или полиэтиленовые ламинатные.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru