

**ПАНТОВИГАР (PANTOVIGAR)**

MERZ PHARMA GmbH & Co. KGaA  
произведено CIMEX AG

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

✧ **Капсулы** твердые желатиновые, с корпусом белого с кремоватым оттенком цвета и крышечкой темно-зеленого цвета; диаметр капсул 6.7-6.9 мм, длина 19.1-19.7 мм; содержимое капсул – светло-коричневый порошок с характерным запахом.

	<b>1 капс.</b>
тиамина мононитрат (вит. В <sub>1</sub> ).....	60 мг
кальция пантотенат (вит. В <sub>5</sub> ).....	60 мг
цистин .....	20 мг
пара-аминобензойная кислота .....	20 мг
кератин .....	20 мг
дрожжи медицинские .....	100 мг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, повидон, кремния диоксид коллоидный.

*Состав оболочки капсулы:* желатин, вода очищенная, титана диоксид, краситель железа оксид желтый, индигокармин.

15 шт. – блистеры (2) – коробки картонные.

15 шт. – блистеры (6) – коробки картонные.

**Номер и дата регистрации:** ЛСР-000045 от 13.04.07

**Код АТХ:** А11ЖС

**Клинико-фармакологическая группа:**

Комплекс витаминов с компонентами природного происхождения, способствующий улучшению роста и структуры волос и ногтей

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Комбинированный препарат, содержащий необходимые для роста волос и ногтей компоненты – кальция пантотенат, цистин, аминокислоты, кератин. Действие препарата обусловлены свойствами входящих в его состав компонентов.

**ФАРМАКОКИНЕТИКА**

Действие препарата Пантовигар является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

**ПОКАЗАНИЯ**

- диффузное выпадение волос негормональной этиологии;
- дегенеративные изменения структуры волос (вследствие химического воздействия, повреждения волос солнечным и ультрафиолетовым излучением);
- нарушение структуры ногтей.

**РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ**

**Взрослым** препарат назначают по 1 капсуле 3 раза/сут. Препарат рекомендуется принимать одновременно с приемом пищи, капсулу следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Длительность курса лечения составляет 3-6 мес. При необходимости возможно увеличение продолжительности курса лечения или его повторение.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

*Аллергические реакции:* кожный зуд, крапивница.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* учащение пульса.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, метеоризм, боли в области живота.

*Прочие:* повышенное потоотделение.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- I и II триместр беременности;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**

Препарат противопоказан к применению в I и II триместрах беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

В III триместре беременности применение препарата возможно только по назначению врача.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Инфекционные заболевания ногтей и андрогенное облысение не являются показаниями к применению препарата. При данных патологиях препарат может быть использован в составе комбинированной терапии.

Следует объяснить пациенту, что формирование волос является длительным процессом, и поэтому препарат необходимо принимать в указанных дозах регулярно в течение 3-6 мес.

Пациент должен быть осведомлен, что если заболевания волос или ногтей принимают неблагоприятное, сильно прогрессирующее течение, необходимо снова обратиться к врачу, т.к. эти заболевания могут быть симптомами системных заболеваний.

Если пациент принимает сульфаниламидные препараты, перед началом приема Пантовигара ему следует проконсультироваться с врачом.

#### **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

О случаях передозировки препарата Пантовигар не сообщалось.

#### **ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

#### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

#### **Мерц Фарма ООО**

123317 Москва, Пресненская наб. 10  
БЦ "Башня на Набережной", блок С  
Тел.: (495) 653-85-55; Факс: (495) 653-85-54