

ПЕНТОВИТ (PENTOVIT)

АЛТАЙВИТАМИНЫ ЗАО

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

◇ <i>Таблетки, покрытые оболочкой</i>	1 таб.
никотинамид	20 мг
пиридоксина гидрохлорид.....	5 мг
тиамина гидрохлорид	10 мг
фолиевая кислота	400 мкг
цианокобаламин	50 мкг
50 шт. – банки полимерные (1) – пачки картонные.	
50 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.	
100 шт. – банки полимерные (1) – пачки картонные.	
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.	
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (2) – пачки картонные.	
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (3) – пачки картонные.	
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (4) – пачки картонные.	
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (5) – пачки картонные.	

Номер и дата регистрации: ЛСР-009395/09 от 23.11.09**Код АТХ:** A11BA**Клинико-фармакологическая группа:**

Комплекс витаминов группы В

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Поливитаминовый препарат, действие которого обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для комбинации данных витаминов является их сочетанное действие на функциональное состояние центральной и периферической нервной системы.

ПОКАЗАНИЯ

- комплексная терапия заболеваний периферической (радикулит, невралгии, невриты) и центральной нервной системы;
- астенические состояния разного генеза.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Внутрь, по 2-4 таблетки 3 раза в день (после еды). Курс лечения – 3-4 недели. Повторные курсы по рекомендации врача.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Противопоказан во время беременности.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не рекомендуется одновременный прием поливитаминовых комплексов, включающих в состав витамины группы В.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Витамин В₆, входящий в данный комплекс, снижает противопаркинсоническую активность леводопы. Алкоголь резко снижает всасывание витамина В₁.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

В сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.