

ПОЛИЖИНАКС (POLYGYNAX)

NEOMYCIN, POLYMYXIN B, NYSTATIN

зарегистрировано
Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL (Франция)
произведено
INNOTHERA CHOUZY (Франция)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Капсулы вагинальные мягкие, от бледно-желтого до бежевого цвета, овальные; содержимое капсул – полужидкая однородная масса от желтого до коричневого цвета.

1 капс.

неомицина сульфат	35 000 МЕ
полимиксина В сульфат	35 000 МЕ
нистатин	100 000 МЕ

Вспомогательные вещества: Тефоз 63® – 125 мг, масло соевое гидрогенизированное – 30 мг, диметикон 1000 – до 2500 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин – 381.2 мг, глицерол – 191.5 мг, диметикон 1000 – 86.9 мг.

6 шт. – блистеры (1) – пачки картонные.

6 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N011782/01 от 11.03.10

Код АТХ: G01AA51

Клинико-фармакологическая группа:

Препарат с антибактериальным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат с антибактериальным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии. Оказывает бактерицидное действие.

Неомицин и полимиксин В активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Streptococcus spp. и анаэробные бактерии нечувствительны к этим антибиотикам.

Нистатин оказывает фунгицидное действие в отношении грибов рода Candida.

Препарат улучшает трофические процессы в слизистой оболочке влагалища.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Равномерно распределяется на слизистой оболочке влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки влагалища.

ПОКАЗАНИЯ

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными микроорганизмами:

- неспецифические вагиниты;
- грибковые вагиниты;
- смешанные вагиниты;
- вульвовагиниты;
- цервиковагиниты.

Профилактика инфекционных осложнений:

- перед операционными гинекологическими вмешательствами;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед внутриматочными диагностическими процедурами;
- перед родами.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Лежа на спине, 1 капсулу вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Курс лечения – 12 дней. Профилактический курс – 6 дней.

В случае пропуска одной или нескольких доз следует возобновить лечение в обычной дозе.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны: аллергические реакции, жжение, зуд, раздражение во влагалище; аллергическая контактная эритема.

При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- I триместр беременности;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Противопоказано применение препарата в I триместре беременности. Применение во II и III триместрах беременности возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Противопоказано применение в период лактации. При необходимости использования препарата в данный период кормление грудью следует прекратить.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа. Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.

Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.

Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

Пациент должен быть предупрежден о необходимости сообщить лечащему врачу об усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов или о появлении других побочных эффектов, не указанных в инструкции.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки препарата Полижинакс не сообщалось.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не рекомендуется использовать Полижинакс одновременно со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.

Laboratoire Innotech International

Представительство в России

127051 Москва, Петровка ул. 20/1, оф. 15

Тел./факс: (495) 775-41-12