

**Листок-вкладыш – информация для пациента**

**Постеризан® форте, суппозитории ректальные**

Действующие вещества: стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli* +  
гидрокортизон

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается в течение 10 дней, Вам следует обратиться к лечащему врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Постеризан® форте, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Постеризан® форте.
3. Применение препарата Постеризан® форте.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Постеризан® форте.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Постеризан® форте, и для чего его применяют**

Препарат Постеризан® форте – суппозитории ректальные, содержащие действующие вещества: стандартизованную суспензию культуры бактерий *E. coli* (кишечной палочки) и гидрокортизон.

Препарат Постеризан® форте за счет активации иммунных механизмов, снижает воспаление и способствует заживлению тканей. Это помогает облегчить зуд и жжение, вызванные геморроидальной болезнью.

Гидрокортизон при местном применении обладает противовоспалительным и антиаллергическим действием. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает отек, покраснение, зуд.

### **Показания к применению**

Препарат Постеризан® форте применяется у взрослых в возрасте от 18 лет при следующих заболеваниях: выраженные зуд и воспаления в анальной области вследствие геморроя.

### **Способ действия препарата**

При местном применении на коже анальной области и слизистой прямой кишки, компоненты препарата запускают местный иммунный ответ. Воздействие препарата на иммунные клетки в подслизистом слое приводит к высвобождению противовоспалительных сигнальных молекул, благодаря работе которых развивается противовоспалительный и противозудный эффект, так же уменьшается отек, нормализуется проницаемость и тонус кровеносных сосудов.

Кроме того, препарат стимулирует регенерацию поврежденных тканей. Ускоренное заживление слизистой прямой кишки способствует уменьшению кровоточивости и болевого симптомов.

Многочисленное введение препарата стимулирует развитие лимфоцитов (иммунных клеток) в лимфатических узлах и выработку антител, что усиливает защиту от инфекционных осложнений геморроидальной болезни.

Гидрокортизон при местном применении обладает противовоспалительным и антиаллергическим действием. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает отек, покраснение, зуд.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О чем следует знать перед применением препарата Постеризан® форте**

### **Противопоказания**

**Не применяйте препарат Постеризан® форте, если:**

- у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- Вы младше 18 лет;
- у Вас бактериальные, грибковые, вирусные заболевания в области лечения;
- специфические кожные заболевания (сифилитический, туберкулезный процесс; гонорея);
- у Вас реакция на вакцинацию;

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Постеризан® форте проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### Дети и подростки

Препарат Постеризан® форте противопоказан детям в возрасте до 18 лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

### **Другие препараты и препарат Постеризан® форте**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При одновременном применении суппозиториев Постеризан® форте и других препаратов с глюкокортикоидами (таблетки, капли или инъекции) могут усиливаться описанные выше побочные действия или побочные действия кортикостероидов.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### *Беременность*

Клинических данных об использовании препарата при беременности и в период грудного вскармливания недостаточно.

Следует избегать назначения препаратов, содержащих глюкокортикостероиды в первом триместре беременности. В ряде исследований показано увеличение риска развития расщелины неба у новорожденных, чьи матери принимали глюкокортикостероиды в первом триместре беременности. Назначение препарата во II и III триместре беременности возможно только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает риск для плода и младенца.

#### *Период грудного вскармливания*

Гидрокортизон выделяется с грудным молоком. Следует прекратить грудное вскармливание на время продолжительного применения или применения высоких доз

гидрокортизона.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Постеризан® форте не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

### **Препарат Постеризан® форте содержит макрогола глицерилгидроксистеарат**

Содержит макрогола глицерилгидроксистеарат. Может вызывать кожные реакции.

### **3. Применение препарата Постеризан® форте**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### Применение у детей

Противопоказано детям младше 18 лет.

#### **Путь и (или) способ введения**

Суппозитории вводят в прямую кишку два раза в сутки (утром и вечером), предпочтительно после дефекации. Рекомендуемая суточная доза - 2 суппозитория.

#### **Продолжительность терапии**

Лечение продолжают до исчезновения симптомов. Лекарственное средство не следует применять более 10 дней без перерыва.

#### **Если Вы приняли препарата Постеризан® форте больше, чем следовало**

О случаях передозировки не сообщалось.

При случайном проглатывании (у детей) могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы (боль в животе, тошнота).

Длительное применение высоких доз повышает системную резорбцию и, следовательно, риск системных эффектов гидрокортизона.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Постеризан® форте может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

#### Общие расстройства и нарушения в месте введения

- Местные реакции гиперчувствительности, например, зуд и жжение (часто - могут встречаться не более чем 1 человека из 10).
- Аллергический контактный дерматит вследствие повышенной чувствительности к консерванту фенолу (не часто - могут встречаться не более чем у 1 человека из 100).
- Длительное применение высоких доз может вызывать атрофию кожи, телеангиоэктазии, стрии и стероидные акне.

### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете собрать больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон горячей линии: 8 800 550 99 03

Электронная почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

<https://roszdravnadzor.gov.ru/>

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 17 242 00 29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

<https://www.rceth.by>

### 5. Хранение препарата Постеризан® форте

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и пачке после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Препарат Постеризан® форте содержит**

Действующие вещества: стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli*, гидрокортизон.

Каждый суппозиторий содержит стандартизованную суспензию культуры бактерий *E. coli* ( $1,00 \times 10^9$  инактивированных микробных клеток) - 387,10 мг, гидрокортизон - 5,00 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: фенол (сжиженный)\*, ацетилцистеин,  $\alpha$ -токоферол, динатрия эдетата дигидрат, макрогола глицерилгидроксистеарат, жир твердый.

\*в составе стандартизованной суспензии культуры бактерий *E. coli*.

### **Внешний вид препарата Постеризан® форте и содержимое упаковки**

Суппозитории ректальные.

Торпедовидные суппозитории от белого до бежевого цвета с характерным запахом фенола. На продольном срезе - однородные, не содержащие посторонних вкраплений, допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

По 5 суппозитория в стрип из алюминиевой фольги с ПУ/ПЭ покрытием. По 2 стрипа вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

### **Держатель регистрационного удостоверения:**

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ, Германия

### **Производитель:**

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ,

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:** Российская Федерация

ООО «Алцея»

129110, Москва, проспект Олимпийский,  
дом 16, строение 5, этаж 5, помещение I

Телефон: +7 (495) 502-92-47

E-Mail: [safety@alceapharma.ru](mailto:safety@alceapharma.ru)

ЗАО «Унифарм» Ивана Козырева

223060, г. Минск, Большое Кольцевое шоссе, 40–1, офис 36, Беларусь

Телефон: +375-17-3940106

E-Mail: [info@unifarm.by](mailto:info@unifarm.by)

[referent@unifarm.by](mailto:referent@unifarm.by)

**Листок-вкладыш пересмотрен**

#### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на веб-сайте Союза:

<https://eec.eaeunion.org>