

ПРОСПАН (PROSPAN)

HEDERAE FOLIUM

*зарегистрировано и произведено ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH&Co.KG (Германия)***ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**✧ **Сироп** светло-коричневого цвета, слегка мутноватый, с запахом вишни.**1 мл**

сухой экстракт листьев плюща (5 – 7.5:1)* 7 мг

Вспомогательные вещества: калия сорбат – 1.34 мг, лимонная кислота безводная – 500 мкг, сорбитол жидкий кристаллизирующийся – 550 мг, камедь ксантановая – 1.5 мг, ароматизатор вишневый – 3 мг, вода очищенная – 566.66 мг.* *Экстрагент:* этанол 30%.

100 мл – флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором – пачки картонные.

200 мл – флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N011382/01 от 02.02.11**Код АТХ:** R05CA**Клинико-фармакологическая группа:**

Фитопрепарат с отхаркивающим и бронхоспазмолитическим действием

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

ПОКАЗАНИЯ

– в качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Внутрь.

Грудным детям (0-1 год) – по 2.5 мл 2 раза/сут.**Маленьким детям (1-6 лет)** – по 2.5 мл 3 раза/сут.**Детям школьного возраста и подросткам** – по 5 мл 3 раза/сут.**Взрослым** – по 5-7.5 мл 3 раза/сут.

Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика.

Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Перед употреблением взбалтывать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции.

Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола).

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- дефицит сахаразы/изомальтазы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.

В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата. Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 2.5 мл сиропа содержат 0.963 г сорбитола, что соответствует 0.08 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат хранить при температуре не выше 25°C.

Срок хранения после вскрытия флакона – 3 месяца.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не применять по истечении срока годности

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.