

Релиф® Адванс инструкция по применению

Суппозитории ректальные от бледно-белого до светло-желтого цвета, непрозрачные, в форме торпеды.

Вспомогательные вещества: масло какао-бобов - 1448 мг, крахмал кукурузный - 340 мг, метилпарагидроксибензоат - 2 мг, пропилпарагидроксибензоат - 4 мг.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
Фармакологическое действие

Бензокаин - местный анестетик, не оказывает резорбтивного действия.

Основа суппозиториев - масло какао - оказывает смягчающее действие.
Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Релиф® Адванс не предоставлены.
Показания препарата Релиф® Адванс

В качестве местного обезболивающего средства:

- геморрой;
- трещины заднего прохода;
- после проктологических операций;
- при проведении диагностических манипуляций.

Режим дозирования

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.

Взрослые и дети старше 12 лет: вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию до 4 раз/сут (утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника) в течение 7 дней. При необходимости по рекомендации врача курс лечения можно продлить до 3 недель.

Дети в возрасте до 12 лет: препарат следует применять только по назначению врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, пациент должен проконсультироваться с врачом.

Препарат следует применять согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов, содержащих бензокаин, в различных условиях. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах, либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Со стороны крови и лимфатической системы: метгемоглобинемия.

Со стороны кожи и подкожных тканей: аллергический дерматит.

Общие и местные реакции: эритема, местное раздражение, отек, боль, сыпь в месте применения.

Если пациент отмечает другие побочные эффекты, следует сообщить об этом врачу.

Противопоказания к применению

повышенная чувствительность к компонентам препарата;
тромбоэмболическая болезнь;
гранулоцитопения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Релиф® Адванс применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) только после консультации врача.

Применение у детей

Не рекомендуется применять препарат у детей в возрасте до 12 лет без согласования с врачом.

Особые указания

При случайном употреблении внутрь следует немедленно обратиться за квалифицированной помощью.

При обильных кровянистых выделениях из заднего прохода или при сохранении болезненных симптомов более 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется применять препарат на поврежденной коже, т.к. это может увеличить системную абсорбцию.

Имеются сообщения о том, что средства, содержащие бензокаин, могут вызывать метгемоглобинемию. Такие симптомы, как цианоз кожи, губ и ногтей, головная боль, головокружение, одышка (затруднение дыхания), слабость, тахикардия, которые наблюдаются во время лечения, могут свидетельствовать о потенциально опасной для жизни метгемоглобинемии, которая требует немедленной медицинской помощи.

В целях минимизации системных побочных эффектов не превышать рекомендуемую суточную дозу, если иное не предписано врачом.

Использование в педиатрии

Не рекомендуется применять препарат у детей в возрасте до 12 лет без согласования с врачом.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Не влияет.

Передозировка

Симптомы могут быть связаны с фармакологическими эффектами бензокаина. Его системная абсорбция при передозировке может проявляться сонливостью, беспокойством, возбуждением; в тяжелых случаях – судорогами. Крайне редко бензокаин в высоких дозах может вызывать метгемоглобинемию, которая проявляется нарушениями дыхания и цианозом.

Лечение: при метгемоглобинемии – в/в введение метиленового синего.

Лекарственное взаимодействие

Лекарственное взаимодействие препарата Релиф® Адванс не описано.

Условия хранения препарата Релиф® Адванс

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности препарата Релиф® Адванс

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.