

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного препарата**  
**Релиф®**

**Регистрационный номер:** П N013560/01

**Торговое название**

Релиф®

**Международное непатентованное или группировочное название**

Фенилэфрин.

**Лекарственная форма**

Мазь для ректального и наружного применения.

**Состав**

1 г мази содержит

Действующее вещество: фенилэфрина гидрохлорид 2,5 мг (0,25 %).

Вспомогательные вещества: масло минеральное 140,0 мг (14 %), вазелин 749,0 мг (74,9 %), метилпарагидроксибензоат 2,0 мг (0,2 %), пропилпарагидроксибензоат 1,0 мг (0,1 %), ланолин безводный 23,5 мг (2,35 %), бензойная кислота 2,0 мг (0,2 %), кукурузы масло 2,0 мг (0,2 %), глицерол 25,0 мг (2,5 %), ланолиновый спирт 15,0 мг (1,5 %), парафин 5,0 мг (0,5 %), вода очищенная 19,0 мг (1,9 %), тимьяна обыкновенного травы масло 1,0 мг (0,1 %), альфа токоферола ацетат (витамин Е) 0,5 мг (0,05 %), воск пчелиный белый 12,5 мг (1,25 %).

**Описание**

Однородная желтая мазь, не содержащая посторонних включений.

**Фармакотерапевтическая группа**

Средство лечения геморроя.

**Код ATХ: C05AX03**

**Фармакологические свойства**

Фенилэфрина гидрохлорид является  $\alpha$ -адреномиметиком, оказывает местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению экссудации, отечности тканей, зуда в аноректальной области.

**Показания к применению**

В качестве симптоматического средства при геморрое, трещинах заднего прохода, анальном зуде.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,

тромбоэмболическая болезнь, гранулоцитопения.

### **С осторожностью**

Артериальная гипертензия, гипертриеоз, сахарный диабет, задержка мочи (гипертрофия предстательной железы), беременность, период лактации.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности нет. Возможно применение для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.

Взрослые и дети старше 12 лет: снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбiku и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в день утром, вечером и после каждого опорожнения кишечника в течение 7-14 дней.

После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок. Мазь наносится также на кожу в области заднего прохода.

### **Побочное действие**

Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов, содержащих фенилэфрин, в различных лекарственных формах. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах, либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата.

#### *Нарушения со стороны иммунной системы*

Аллергические реакции.

#### *Общие расстройства и нарушения в месте введения*

Раздражение по типу контактного дерматита в месте нанесения.

#### *Нарушения со стороны эндокринной системы*

Обострение гипертриеоза.

#### *Нарушения со стороны нервной системы*

Тремор, бессонница, нервозность.

#### *Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы*

Аритмия, повышение артериального давления.

## **Передозировка**

Продолжительное или чрезмерное местное применение фенилэфрина могут привести к нарушениям со стороны нервной системы, например, нервозности.

Лечение: симптоматическое.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Из-за содержащегося фенилэфрина снижается действие гипотензивных лекарственных средств. При одновременном назначении с антидепрессантами – ингибиторами МАО возможно развитие гипертонического криза.

## **Особые указания**

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом.

В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратится за консультацией к врачу.

Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО.

Следует избегать контакта препарата с изделиями из латекса (контрацептивные диафрагмы и презервативы) во избежание снижения их эффективности.

## **Влияние на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами.

## **Форма выпуска**

Мазь для ректального и наружного применения 2,5 мг/г.

По 28,4 г в пластиковую тубу с крышкой из полипропилена. Горлышко тубы опечатано защитной упаковкой из фольги. Тубу вместе с аппликатором и инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

## **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

## **Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Владелец регистрационного удостоверения:

АО «БАЙЕР», Россия

Произведено: Фамар С.А., завод Авлон, 49-й км национальной дороги Афины-Ламия,  
г. Авлона, Аттика, 19011, Греция

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «БАЙЕР», Россия

107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2

Тел.: +7 (495) 231-12-00

[www.bayer.ru](http://www.bayer.ru)

**Данная версия инструкции действует с 28.02.2019**