РОВАТИНЕКС (ROWATINEX)

зарегистрировано и произведено
ROWA PHARMACEUTIKALS Ltd. (Ирландия)
продвижение на территории РФ
СВИЧ ООО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Капсулы кишечнорастворимые сферические желатиновые, желтого цвета; содержимое капсул – жидкость бледно-желтого или зеленовато-желтого цвета, с сильным ароматическим запахом.

	1 капс.
α,β-пинен	31 мг
камфен	15 мг
цинеол	3 мг
фенхон	4 мг
борнеол	10 мг
анетол	4 мг

Вспомогательные вещества: масло оливковое.
Состав оболочки: желатин, глицерол 85%, натрия этилпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат, хинолин желтый WS 70% (E104), закатно-желтый FCF 85% (E110).
10 шт. – блистеры (5) – пачки картонные.
10 шт. – блистеры (10) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: ЛСР-006862/08 от 22.08.08

Код АТХ: G04BX

Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат с диуретическим, спазмолитическим и литолитическим действием

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Фитопрепарат, способствующий дезинтеграции и выведению почечных камней и камней мочевыводящего тракта. Терпены, такие как борнеол, претерпевают метаболические изменения и выводятся с мочой, в основном, в форме глюкуронидов, что повышает растворимость кальциевых солей, являющихся основными компонентами камней почек и камней мочевыводящего тракта.
В экспериментальных исследованиях был установлен ингибирующий эффект Роватинекса на формирование почечных камней и камней мочевыводящего тракта.
Роватинекс оказывает спазмолитическое действие, способствует прохождению камней по мочевыводящим путям, уменьшает боли при почечных и мочеточниковых коликах, усиливает почечный кровоток, улучшая функцию почек и повышая диурез.
Препарат обладает противовоспалительным действием, противомикробным действием (по отношению к целому ряду грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов), повышает содержание защитных коллоидов в моче и повышает содержание глюкуроновой кислоты в моче.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Присутствующие в препарате терпены жирорастворимы и быстро усваиваются.
Терпены, такие как борнеол, в значительной мере претерпевают метаболические изменения в организме человека, превращаясь в глюкурониды, которые выводятся с мочой.

ПОКАЗАНИЯ

− мочекаменная болезнь (нефролитиаз, уролитиаз);
− профилактика образования камней в почках и мочевыводящих путях.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат принимают внутрь до еды.
Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1-2 капс. 3 раза/сут. При *почечной колике* дозу можно увеличить до 2-3 капс. 4-5 раз/сут.
Детям в возрасте 6-14 лет препарат назначают по 1 капс. 2 раза/сут.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Со стороны пищеварительной системы: редко – легкий и преходящий дискомфорт в желудке; очень редко – рвота.
Прочие: у 2 пациентов была замечена непереносимость препарата (причина неизвестна).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

− детский возраст до 6 лет;
− повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С *осторожностью* следует назначать препарат при одновременном приеме пероральных антикоагулянтов и препаратов, преимущественно метаболизирующихся в печени.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Не рекомендуется применение Роватинекса в I триместре беременности и в период лактации.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять Роватинекс при выраженной почечной колике, анурии или тяжелой инфекции мочевыводящих путей.

В процессе лечения следует увеличить прием жидкости.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Лечение: промывание желудка (если препарат принят недавно); следует установить наблюдение за больным (мониторинг сердечной, дыхательной, почечной и печеночной функций); при необходимости проводить симптоматическую терапию.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При одновременном применении Роватинекс может изменять активность антикоагулянтов, а также препаратов, метаболизирующихся в печени.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 5 лет.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.

СВИЧ ООО
191040 Санкт-Петербург
Пушкинская ул. 12/2 – 21
Тел./факс: (812) 572-22-76