

СТРУКТУМ (STRUCTUM®)

CHONDROITIN SULFATE SODIUM

*зарегистрировано и произведено**PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция)**упаковано**ФармФирма СОТЕКС ЗАО (Россия)***ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

✧ **Капсулы** желатиновые, размер №1, от светло-голубого до голубого цвета; содержимое капсул – порошок беловато-кремового цвета, допускается наличие конгломератов (комочков), связанных с особенностями пространственной структуры.

1 капс.

хондроитин сульфат натрия 250 мг

Вспомогательные вещества: тальк – 5 мг.*Состав оболочки капсулы:* индигокармин, титана диоксид, желатин.

15 шт. – блистеры (4) – пачки картонные.

✧ **Капсулы** желатиновые, размер №0, от светло-голубого до голубого цвета; содержимое капсул – порошок беловато-кремового цвета, допускается наличие конгломератов (комочков), связанных с особенностями пространственной структуры.

1 капс.

хондроитин сульфат натрия 500 мг

Вспомогательные вещества: тальк – 10 мг.*Состав оболочки капсулы:* индигокармин, титана диоксид, желатин.

12 шт. – блистеры (5) – пачки картонные.

20 шт. – блистеры (3) – пачки картонные.

20 шт. – блистеры (4) – пачки картонные.

20 шт. – блистеры (5) – пачки картонные.

20 шт. – блистеры (6) – пачки картонные.

20 шт. – блистеры (7) – пачки картонные.

20 шт. – блистеры (10) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N013685/01 от 06.07.07**Код АТХ:** M01AX25**Клинико-фармакологическая группа:**

Препарат, стимулирующий процесс регенерации хрящевой ткани

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Структум влияет на обменные процессы в гиалиновом и волокнистом хрящах, уменьшает дегенеративные процессы в хрящевой ткани суставов, стимулирует биосинтез гликозамингликанов. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани.

При лечении препаратом Структум уменьшается болезненность и улучшается подвижность пораженных суставов. Терапевтический эффект сохраняется длительное время после окончания курса терапии.

ФАРМАКОКИНЕТИКА*Всасывание и распределение*

После приема препарата внутрь более 70% хондроитин сульфата абсорбируется из ЖКТ. После однократного приема в средней терапевтической дозе C_{max} в плазме крови достигается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости – через 4-5 ч. Биодоступность препарата составляет 13%. Хондроитин сульфат накапливается в синовиальной жидкости.

Выведение

Выводится почками.

ПОКАЗАНИЯ

- остеоартроз;
- межпозвоночный остеохондроз.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Капсулы принимают внутрь, запивая водой.

Взрослым и подросткам в возрасте 15 лет и старше препарат назначают в дозе 1 г/сут – по 2 капсулы 250 мг или по 1 капсуле 500 мг 2 раза/сут.

Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения составляет 6 мес. Терапевтическое действие препарата сохраняется в течение 3-5 месяцев после его отмены в зависимости от локализации и стадии заболевания. При необходимости возможно проведение повторных курсов лечения, продолжительность которых врач устанавливает индивидуально.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Со стороны пищеварительной системы: редко – тошнота, рвота.

Аллергические реакции: редко – крапивница, эритема, кожный зуд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 15 лет (ввиду отсутствия точных данных).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Структум не рекомендуется назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) ввиду отсутствия достаточного количества клинических данных.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

С осторожностью назначают препарат при кровотечениях или склонности к кровотечениям.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: редко – тошнота, рвота, диарея, при длительном приеме в чрезмерно высоких дозах (более 3 г/сут) возможны геморрагические высыпания.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При одновременном применении с препаратом Структум возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов и фибринолитиков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается без рецепта.

ФармФирма СОТЕКС ЗАО
141345 Московская обл.,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н,
сельское поселение Березняковское,
пос. Беликово, д. 11
Тел./факс: (495) 956-29-30