

**ТЕРЖИНАН (TERGYNAN)**

зарегистрировано  
Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI (Франция)  
произведено  
SOPHARTEX (Франция)

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

**Таблетки вагинальные** светло-желтого цвета, с возможными вкраплениями более темных или светлых оттенков, плоские, продолговатой формы, с фаской по краям и напечаткой в виде буквы "Т" с обеих сторон.

**1 таб.**

тернидазол .....	200 мг
неомицина сульфат .....	100 мг (65 000 МЕ)
нистатин .....	100 000 МЕ
преднизолона метасульфобензоат натрия.....	4.7 мг,
что соответствует содержанию преднизолона.....	3 мг

**Вспомогательные вещества:** крахмал пшеничный – 264 мг, лактозы моногидрат – q.s. до 1.2 г, кремния диоксид коллоидный – 6 мг, магния стеарат – 10 мг, карбоксиметилкрахмал натрия – 48 мг.

6 шт. – стрипы (1) – пачки картонные.

10 шт. – стрипы (1) – пачки картонные.

**Номер и дата регистрации:** П N015129/01 от 21.07.08

**Код АТХ:** G01BA

**Клинико-фармакологическая группа:**

Препарат с антибактериальным, противопротозойным, противогрибковым и противовоспалительным действием для местного применения в гинекологии

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии. Оказывает противомикробное, противовоспалительное, противопротозойное, противогрибковое действие; обеспечивает целостность слизистой оболочки влагалища и постоянство pH.

*Тернидазол* – противогрибковое средство из группы производных имидазола, снижает синтез эргостерола (составной части клеточной мембраны), изменяет структуру и свойства клеточной мембраны. Оказывает трихомонацидное действие, активен также в отношении анаэробных бактерий, в частности Gardnerella spp.

*Неомицин* – антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов. Действует бактерицидно в отношении грамположительных (Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae) и грамотрицательных (Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei, Proteus spp.) микроорганизмов; малоактивен в отношении Streptococcus spp. Устойчивость микроорганизмов развивается медленно и в небольшой степени.

*Нистатин* – противогрибковый антибиотик из группы полиенов, высокоэффективен в отношении дрожжеподобных грибов рода Candida, изменяет проницаемость клеточных мембран и замедляет их рост.

*Преднизолон* – дегидрированный аналог гидрокортизона, оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое, противозекссудативное действие.

**ФАРМАКОКИНЕТИКА**

Данные по фармакокинетике препарата Тержинан не предоставлены.

**ПОКАЗАНИЯ**

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, в т.ч.:

- бактериальный вагинит;
- трихомониаз влагалища;
- вагинит, вызванный грибами рода Candida;
- смешанный вагинит.

Профилактика урогенитальных инфекций/вагинитов, в т.ч.:

- перед гинекологическими операциями;
- перед родами или абортom;
- до и после установки ВМС;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед гистерографией.

**РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ**

Для вагинального введения.

1 таблетку вводят глубоко во влагалище в положении лежа перед сном. Перед введением таблетку следует подержать в воде в течение 20-30 сек. После введения необходимо лежать в течение 10-15 мин.

Средняя продолжительность *лечебного курса* – 10 дней; в случае *подтвержденного микоза* продолжительность лечения может быть увеличена до 20 дней; средняя продолжительность *профилактического курса* – 6 дней.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

*Местные реакции:* редко – чувство жжения, зуд и раздражение во влагалище (особенно в начале терапии).

*Прочие:* в отдельных случаях – аллергические реакции.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**

Возможно применение Тержинана со II триместра беременности.

Применение Тержинана в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

В случае лечения вагинитов, трихомониаза рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.

Не следует прекращать лечение во время менструации.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Нет данных о случаях передозировки.

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Лекарственное взаимодействие препарата Тержинан не выявлено.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Препарат отпускается по рецепту.

**Laboratoires BOUCHARA**

РУСФИК ООО

123610 Москва, Краснопресненская наб. 12

г-ца "Международная-2", оф. 747

Тел.: (495) 258-20-06; Факс: (495) 258-20-07