

**ТРОКСЕВАЗИН®
(TROXEVASIN®)****гель**

TROXERUTIN

*зарегистрировано и произведено
BALKANPHARMA-TROYAN AD (Болгария)***ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**✧ *Гель для наружного применения 2%* от желтого до светло-коричневого цвета.**1 г**

троксерутин 20 мг

Вспомогательные вещества: карбомер – 6 мг, троламин (триэтаноламин) – 7 мг, динатрия эдетата дигидрат – 0.5 мг, бензалкония хлорид – 1 мг, вода очищенная – 965.5 мг.

40 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.

40 г – тубы ламинатные (пластиковые) (1) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N012713/02 от 15.08.08**Код АТХ:** C05CA04**Клинико-фармакологическая группа:**

Венотонизирующий препарат для наружного применения

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Троксевазин® представляет собой флавоноид (производное рутина). Обладает Р-витаминной активностью; оказывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диapedез клеток крови. Уменьшает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При нанесении геля на область поражения, активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.

ПОКАЗАНИЯ

- варикозная болезнь;
- хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах; чувство тяжести, налитости, усталости ног; сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;
- тромбоз вен;
- перифлебит;
- варикозный дерматит;
- боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Наружно.

Гель наносят на область поражения 2 раза/сут утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени. Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин® для усиления воздействия. Если симптомы течения заболевания ухудшаются или не проходят через 6-7 дней ежедневного применения препарата, пациенту следует обратиться к врачу.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В *редких случаях* наблюдаются аллергические кожные реакции – крапивница, экзема, дерматит.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- нарушение целостности кожных покровов;
- повышенная чувствительность к препарату.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Данных относительно нежелательного воздействия на плод и новорожденного при использовании препарата нет.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Гель наносят только на неповрежденную поверхность.

Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки.

При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Троксевазин® гель не оказывает влияния на способность управлять автотранспортным средством и работать с движущимися механизмами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Ввиду наружного способа применения и большой терапевтической широты препарата опасности возникновения передозировки нет. При случайном проглатывании большого количества геля необходимо провести общие меры выведения препарата из организма (рвотные средства) и обратиться к врачу. При наличии показаний проводится перитонеальный диализ.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии препарата Троксевазин® отсутствуют.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не замораживать. Срок годности для препарата в алюминиевой тубе – 5 лет, в ламинатной (пластиковой) тубе – 2 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

АКТАВИС ГРУПП АО

Представительство в России ООО "Активис"

115054 Москва, Валовая ул. 35

Тел.: (495) 644-44-14, 644-22-34

Факс: (495) 644-44-24, 644-22-35