

**ТРОКСЕВАЗИН® НЕО  
(TROXEVASIN® NEO)**

HEPARIN SODIUM, TROXERUTIN, DEXPANTHENOL

зарегистрировано  
ACTAVIS GROUP PTC ehf. (Исландия)  
произведено  
BALKANPHARMA-TROYAN AD (Болгария)

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**

✧ *Гель для наружного применения* от желтоватого до зеленовато-желтого цвета, прозрачный или почти прозрачный.

**1 г**

гепарин натрия ..... 1.7 мг (300 МЕ)

троксерутин ..... 20 мг

декспантенол ..... 50 мг

*Вспомогательные вещества:* карбомер – 7 мг, пропиленгликоль – 100 мг, метилпарагидроксибензоат – 0.8 мг, пропилпарагидроксибензоат – 0.2 мг, троламин – 4.2 мг, вода очищенная – до 1 г.

40 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.

40 г – тубы ламинатные (1) – пачки картонные.

100 г – тубы ламинатные (1) – пачки картонные.

**Номер и дата регистрации:** ЛП-002139 от 12.07.13**Код АТХ:** C05BA53**Клинико-фармакологическая группа:**

Препарат с антитромботическим, ангиопротекторным, венотонизирующим и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Комбинированный препарат для наружного применения. Действие обусловлено входящими в его состав ингредиентами.

*Троксерутин* – ангиопротекторное средство. Обладает Р-витаминной активностью: оказывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки. Способствует нормализации микроциркуляции и трофики тканей, уменьшает застойные явления.

*Гепарин* – антикоагулянт прямого действия, естественный противосвертывающий фактор организма. Препятствует тромбообразованию, активизирует фибринолитические свойства крови, улучшает местный кровоток. Оказывает противовоспалительное действие, способствует регенерации соединительной ткани за счет угнетения активности гиалуронидазы.

*Декспантенол* – провитамин В<sub>5</sub> – в коже превращается в пантотеновую кислоту, входящую в состав кофермента А, который играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления. Улучшая обменные процессы, декспантенол способствует регенерации поврежденных тканей; улучшает всасывание гепарина.

**ФАРМАКОКИНЕТИКА**

При местном применении активные вещества быстро абсорбируются кожей.

*Троксерутин* через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч – в подкожно-жировой клетчатке. Проникновение троксерутина в системный кровоток клинически незначимо.

*Гепарин* накапливается в верхних слоях и активно связывается с протеинами кожи. При наружном применении незначительное количество гепарина проникает в системный кровоток, не оказывая системного действия, не вызывая каких-либо изменений параметров свертывания крови. Не проникает через плацентарный барьер.

*Декспантенол* проникает во все слои кожи и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизменном виде.

**ПОКАЗАНИЯ**

- варикозная болезнь;
- хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как отечность и боли в ногах, чувство тяжести, налитости, усталости ног, сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;
- тромбозы;
- перифлебит;
- варикозный дерматит;
- боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

**РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ**

Применяют наружно. Гель наносят тонким слоем на область поражения 2 раза/сут утром и вечером, равномерно распределяя по поверхности кожи легкими втирающими движениями до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени. Курс лечения составляет 2-3 недели. Необходимость более длительного лечения определяет лечащий врач. Повторный курс лечения рекомендуется проводить 2-3 раза в год.

Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин® для усиления воздействия.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд (в месте нанесения препарата).

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- открытые инфицированные раны или раны с обильной экссудацией в месте нанесения;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский и подростковый возраст до 18 лет (опыт применения отсутствует).

**БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**

Троксевазин® Нео разрешен к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Избегать попадания на открытые раны, слизистые оболочки и в глаза!

Препарат Троксевазин® Нео не предназначен для применения в офтальмологии, для интравагинального и ректального введения.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

На фоне приема препарата какого-либо отрицательного влияния на способность управлять автомобилем или другими техническими средствами не наблюдалось.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Передозировка маловероятна в связи с малой системной абсорбцией активных компонентов геля.

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Взаимодействия препарата Троксевазин® Нео с другими лекарственными средствами не выявлено.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

**АКТАВИС ГРУПП АО**

Представительство в России ООО "Актавис"

115054 Москва, Валовая ул. 35

Тел.: (495) 644-44-14, 644-22-34

Факс: (495) 644-44-24, 644-22-35