

ЦИ-КЛИМ®

Регистрационный номер: ЛСР-006592/09

Торговое наименование: ЦИ-КЛИМ®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Цимицифуги даурской корневищ с корнями экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав (на одну таблетку)

Активный компонент: цимицифуги экстракт сухой с содержанием суммы тритерпеновых гликозидов в пересчете на 27-деоксиактеин 2,5 % – 0,02 г

Вспомогательные вещества ядра:

целлюлоза микрокристаллическая - 0,145 г, крахмал картофельный - 0,055 г, кальция стеарат - 0,0019 г, кремния диоксид коллоидный - 0,0011.

Вспомогательные вещества оболочки: гипромеллоза (Е 464, гидроксипропилметилцеллюлоза) - 0,0035 г, титана диоксид (Е 171) - 0,0015 г, полисорбат-80 (твин 80) - 0,0010 г, макрогол-400 (Е 1521, полиэтиленгликоль 400) - 0,0007 г, краситель железа оксид красный - 0,0002 г, краситель железа оксид коричневый (ФЕРРОНАТ) - 0,0001 г.

Описание

Круглые таблетки, покрытые оболочкой, двояковыпуклой формы, от розового цвета до розового цвета с коричневым оттенком, характерного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Противоклимактерическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: G02CX

Фармакологические свойства

ЦИ-КЛИМ® обладает эстрогеноподобным действием, проявляет седативные свойства, оказывает положительное терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему.

ЦИ-КЛИМ® снижает концентрацию ФСГ и ЛГ, повышает концентрацию эстрадиола, что ведет к устранению ранних климактерических расстройств (психоземональные и вегето-сосудистые нарушения) и отсроченных климактерических расстройств, обусловленных дефицитом эстрогенов.

Терапевтический эффект препарата ЦИ-КЛИМ® развивается постепенно и проявляется приблизительно через 2-4 недели лечения.

Показания к применению

Веgetо-сосудистые и психоэмоциональные расстройства в пре-, мено- и постменопаузе («приливы», повышенная потливость, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, изменение настроения, апатия и др.).

Расстройства, обусловленные дефицитом эстрогенов в период менопаузы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эстроген-зависимые опухоли, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью: нарушение функции печени, эпилепсия, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

ЦИ-КЛИМ® принимают внутрь по 1 таблетке (не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости) 2 раза в сутки, по возможности, в одно и то же время (утром и вечером).

Длительность лечения определяется врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. В редких случаях возможно появление боли в эпигастральной области и увеличение массы тела.

Передозировка

При случайном применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, могут наблюдаться диспепсия, гастралгия, нарушение функции печени.

Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В связи с возможностью передозировки не рекомендуется принимать с другими препаратами, содержащими цимицифуги экстракт.

Особые указания

Без консультации врача препарат не следует принимать более 3 месяцев

При изменении характера менструального цикла, а также при продолжительных или других вновь возникающих жалобах необходимо обратиться к врачу

При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

ЦИ-КЛИМ® не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.)

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг.

По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой. По 1, 2, 3 или 4 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C, в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

ЦИ-Клим Аланин

Регистрационный номер: ЛП-003982

Торговое наименование: Ци-Клим®Аланин

Международное непатентованное или группировочное наименование: бета-аланин

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Действующее вещество: бета-аланин - 400 мг.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 69,33 мг, крахмал картофельный - 26,55 мг, мальтодекстрин - 19,47 мг, кремния диоксид коллоидный - 11,00 мг, тальк - 11,00 мг, кроскармеллоза натрия - 8,25 мг, кальция стеарат - 4,40 мг.

Описание: таблетки круглые, двояковыпуклые, белого или почти белого цвета. На поверхности таблеток допускается мраморность.

Фармакотерапевтическая группа: противоклимактерическое средство.

Код АТХ: G02CX

Фармакологические свойства

Бета-аланин является аминокислотой. Противодействует резкому высвобождению гистамина, но не обладает антигистаминной активностью благодаря отсутствию блокады H1-рецепторов.

Бета-аланин имеет прямое воздействие на кожную периферическую вазодилатацию, которая обуславливает вегетативные "приливы", ощущение тепла, жара, головную боль. На физиологическом уровне вазомоторные "приливы" обусловлены активностью терморегуляторных центров в гипоталамусе, приводящей к периферической кожной вазодилатации. Это следствие реакций, происходящих при нарушении баланса церебральных нейротрансмиттеров, наступающем после прекращения секреции гормонов яичниками. Препарат способствует насыщению периферических рецепторов нейротрансмиттеров, которые участвуют в этом процессе.

Показания для применения

"Приливы", обусловленные климактерическим периодом.

Противопоказания для применения

Повышенная чувствительность к бета-аланину или любому из вспомогательных веществ препарата.

Меры предосторожности при применении

Перед началом приема препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не предназначен для применения в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь.

По 1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличена до 3-х таблеток в день. Длительность лечения от 5-10 дней до исчезновения "приливов".

При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения.

В связи с тем, что привыкания к препарату не возникает, лечение может быть продлено на весь период вазомоторных клинических расстройств без ограничения его продолжительности.

Побочное действие

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь).

Очень редко: преходящие парестезии, как правило, в конечностях.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

В случае передозировки препарата проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.)

Форма выпуска

Таблетки 400 мг.

По 15 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки, изготовленной на основе фольги алюминиевой. По 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.